

N LE NATURALISTE V VENDEËEN

En ligne ISSN 2800-4353

n° 15 : 53-54



La Punaise grise panachée de noir,
Heterogaster cathariae (Hemiptera, Heterogastridae)
une nouvelle punaise en Pays de la Loire, observée en Vendée

Anne-Lise CHARPENTIER



Revue numérique aperiodique

ISSN 2800-4353

publiée par l'association
Les Naturalistes Vendéens

N° 15 : 53-54

Éditeur : LES NATURALISTES VENDÉENS, association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901,
SIRET n° 498 774 447 00029.

Siège social : boîte 135, pôle associatif, 71 boulevard Aristide Briand
85000 LA ROCHE-SUR-YON.

Courriel : contact@naturalistes-vendeens.org

Site Web : <https://naturalistes-vendeens.org>

Directeur de la publication : Christian GOYAUD.

Mis en ligne le : 08-10-2025.

Dépôt légal : octobre 2025.

Prix du numéro : publication gratuite, en libre accès sur <https://naturalistes-vendeens.org>

Comité de lecture : Patrick BOHAIN, Pascal BOUTON, Anne-Lise CHARPENTIER, Michel COUGNON, Christian GOYAUD, Richard LEMARIÉ, Jean-Paul PAILLAT, Georges PICHAUD, Alain TEXIER et Jean-Marc VIAUD.

Mise en page : C. GOYAUD.

Illustration de couverture : *Heterogaster cathariae*, photo : Anne-Lise Charpentier.



© Les Naturalistes Vendéens. Tous droits de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

Les opinions exprimées dans la revue n'engagent que leurs auteurs

La Punaise grise panachée de noir, *Heterogaster cathariae* (Hemiptera, Heterogastridae), une nouvelle punaise en Pays de la Loire observée en Vendée

Anne-Lise CHARPENTIER¹

Résumé : *Heterogaster cathariae* a été observé en Vendée en juin 2025. C'est une nouvelle espèce de punaise pour la région des Pays de la Loire.

Mots-clés : *Heterogaster cathariae*, Hemiptera, Pays de la Loire, Vendée (France).

Abstract: *Heterogaster cathariae* was observed in Vendée in June 2025. It is a new species of bug for the Pays de la Loire region.

Key-words: *Heterogaster cathariae*, Hemiptera, Pays de la Loire, Vendée (France).

La liste des punaises ligériennes s'enrichit d'une nouvelle espèce appartenant au genre *Heterogaster*. La Punaise grise panachée de noir *Heterogaster cathariae* (Geoffroy, 1785) a été observée sur la commune de L'Herbergement (85) en juin dernier (fig.1). Un inventaire des insectes sur le site du producteur de semences biologiques "La Boîte à Graines", au lieu-dit la Corbinière, a mis en évidence la présence d'une belle diversité d'insectes. Parmi eux, se trouvait cette petite punaise de quelques millimètres, trouvée tout juste en fin de journée dans les rangées des plantes cultivées pour leurs graines.

En Pays de la Loire, elle complète une liste qui comprenait jusqu'alors trois espèces du genre *Heterogaster* : *Heterogaster urticae* (la plus répandue), *Heterogaster artemisiae* (présente en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Sarthe) et *Heterogaster affinis* (2 localités, en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire). Toutes appartiennent à la famille des *Heterogastridae*.

Le genre *Heterogaster* se caractérise par la présence d'une petite épine distale sur les profémurs et par les bords latéraux du pronotum sinués. Chez *Heterogaster cathariae* les tibias pré-



Fig. 1 – *Heterogaster cathariae* (photo A-L. Charpentier)

¹ 5, Fromage, 85600 MONTAIGU-VENDEE, France – al.charpentier@hotmail.fr

Mis en ligne le 08-10-2025.

Citation : CHARPENTIER A-L., 2025. – La Punaise grise panachée de noir, *Heterogaster cathariae* (Hemiptera, Heterogastridae), une nouvelle punaise en Pays de la Loire observée en Vendée. *Le Naturaliste Vendéen*, 15 : 53-54.




Fig. 2 – *Heterogaster cathariae*, habitus d'un mâle d'Espagne. Illustration tirée de Faune de France 84 A [PÉRICART, 1999, fig. 129]

sentent deux anneaux noirs, tandis que trois sont observés chez *Heterogaster urticae* et *Heterogaster affinis*. La taille de *Heterogaster cathariae* est comprise entre 6,4 et 7,5 mm (fig. 2), tandis qu'elle est inférieure à 5,5 mm chez *Heterogaster artemisiae*. Les antennes sont presque entière-

ment sombres ; les articles III et IV peuvent être jaunâtres à la base. Les hémélytres présentent le plus souvent une tache brune rectangulaire au niveau de l'angle apical des cories. La pointe de celles-ci reste claire et imponctuée. Les membranes sont incolores, parfois rembrunies à la base [PÉRICART, 1999, p. 429-432].

L'espèce est connue pour être phytophage, suceuse de sève, notamment sur les Lamiacées. Après avoir passé l'hiver dans la litière sèche, les adultes s'activent de nouveau au printemps. En juin, ils finissent par s'orienter vers leurs plantes-hôtes, du genre *Nepeta*, *Lycopus europaeus*, *Melissa officinalis*, *Salvia officinalis*. C'est dans le calice des fleurs que les femelles laisseront leurs œufs. Les larves apparaîtront alors entre août et septembre.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- PÉRICART J., 1999. – *Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens, volume 1, généralités, systématique : première partie*. Paris, Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Faune de France 84 A, 495 p.
- BRAUN P., LIPPERT S., WEIGAND A. & LUPOLI R., 2023. – First record of *Heterogaster cathariae* (Geoffroy, 1785) (Hemiptera, Heteroptera, Heterogastridae) in Luxembourg and first global DNA barcodes. *Bulletin de la Société des naturalistes luxembourgeois*. 125 : 65-73.