La Rainette méridionale *Hyla meridionalis* Boettger, 1874 contactée en forêt de Longeville-sur-Mer (Vendée)

Alain THOMAS

Abstract: Observations of the Stripeless Tree Frog in the coastal woodlands of Longeville-sur-Mer (Vendée), at the northernmost limit of its distribution, seem to indicate a recent expansion in its range.

Mots-clés : Rainette méridionale, *Hyla meridionalis* Boettger 1874, Vendée (France).
Key words: Stripeless tree frog, *Hyla meridionalis* Boettger 1874, Vendée (France).

Les 10 et 11 mai 2006, à l'occasion d'un inventaire des cantonnements d'Engoulevents d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) de la forêt dunaire de Longeville-sur-Mer, deux chanteurs de Rainette méridionale (*Hyla meridionalis* Boettger 1874) ont été entendus. Ces individus, distants d'environ 1 100 m, se trouvaient dans la partie centrale de la forêt, l'un non loin d'une zone urbanisée et l'autre à proximité d'une mare. Il s'agit là probablement de la première mention de cette espèce dans la partie ouest du Marais poitevin.

Dans le Marais poitevin, la Rainette méridionale est présente en Charente-Maritime, au sud de la Sèvre Niortaise sur les communes de Marans, Charron et Esnandes où elle peut être abondante par endroits. Au nord de la rivière, elle est plus localisée, parfois à proximité de la Vendée comme du côté de L'Île-d'Elle, mais probablement présente depuis longtemps. En 1989, je la notais déjà à Landelènes (Marans).

En Vendée, Madeleine Paillette la mentionne à Champagné-les-Marais en 1961. Il faut attendre 1999 et sa redécouverte fortuite par Hugues des Touches, pour reparler de la Rainette méridionale en Vendée. Les prospections que j'ai alors entreprises seul, puis avec Emmanuel Joyeux (ONCFS, Réserve Naturelle de la baie de l'Aiguillon) ont permis de mieux définir la zone de présence de la Rainette méridionale dans le Sud-Vendée. Ce travail reste à affiner mais on peut aujourd'hui évaluer à environ 4 000 ha l'aire de répartition de l'espèce en Vendée.

Les individus de Longeville sont à 25 km de la population des prises de la baie de l'Aiguillon, dans une zone bien prospectée pour ce qui est des Amphibiens. Outre la progression géographique notable que représenterait l'implantation d'une population en forêt de Longeville, il faut souligner le fait que, contrairement aux populations des prises de la baie de l'Aiguillon, la Rainette méridionale se trouve ici au contact direct de la Rainette verte (*Hyla arborea*).

L'origine de ces individus est incertaine. Il paraît improbable qu'une population de Rainettes méridionales soit passée inaperçue ici ou dans les marais périphériques de la forêt. Par ailleurs, il n'existe pas, *a priori*, de population entre Champagné-les-Marais et Longeville. Toutefois, nous avons deux mentions restées sans suite de Rainette méridionale dans l'ouest du Marais poitevin : un individu capturé le long du couloir d'accès à l'observatoire de la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré en juillet 1992 (obs. pers.) et un chanteur près d'une habitation entre Saint-Denis-du-Payré et Lairoux en 2000 (Hugues des Touches et Alain Thomas).

La population vendéenne de la Rainette méridionale constitue la limite septentrionale de l'espèce. Les nouvelles données en forêt de Longeville sont particulièrement intéressantes et pourraient indiquer une progression de l'espèce vers le nord. La poursuite du travail de prospection en périphérie de la population des prises de la baie de l'Aiguillon est nécessaire d'un point de vue naturaliste pour suivre la dynamique de l'espèce.

Alain THOMAS
11 rue Marcel Lebois
85750 MORICQ
Tél. : 02 51 97 59 98

© *Les Naturalistes Vendéens*